

## KULLANMA TALİMATI

# LEVORUP® 30 mg/5 ml Şurup

### AŞİDAN ALINIR

• **Etkin madde:** Her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg levodropropizin içerir.

**Yardımcı maddeler:** Sakkaroz, metil paraben (E218), propil paraben (E216), sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, dağ çileği aroması ve deiyonize su.

**Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

— Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

— Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

— Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

— Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

— Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.

### Bu kullanma talimatında:

1. LEVORUP nedir ve ne için kullanılır?
2. LEVORUP'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEVORUP nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LEVORUP'un saklanması

### Baflıkların yer almaktadır.

#### 1. LEVORUP nedir ve ne için kullanılır?

- LEVORUP 150 ml'lik bal rengi cam şişede, 5 ml'lik ölçü kaşığı ile birlikte sunulur. Rensiz-hafif sarı renkli berrak çözelti görünümündedir.
- LEVORUP etkin madde olarak levodropropizin içerir.
- LEVORUP çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

#### 2. LEVORUP'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

#### LEVORUP'u almadan önceki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Levodropropizine veya LEVORUP'un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
- Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
- Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız LEVORUP'u kullanmayınız.

#### LEVORUP'u almadan önceki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa hekiminize danışmadan LEVORUP'u kullanmayınız.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa, hekiminize danışmadan LEVORUP'u kullanmayınız.

Öksürük ilaçları alta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tesbit edilinceye kadar kullanılmalıdır. Bu uyarıları geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

**LEVORUP'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:** LEVORUP'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

#### Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levodropropizin plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVORUP'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, zorunlu olmadıkça emzirirken kullanmayınız.

#### Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

**LEVORUP'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler** 10 ml LEVORUP 6 g şeker içerdiği için diyabet (şeker) hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. LEVORUP'un içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu tıbbi ürün 1 ml'de 1.49 mg, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

#### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

### 3. LEVORUP nasıl kullanılır?

#### • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. LEVORUP erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır. İlaç 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtilen bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

#### • Uygulama yolu ve metodu:

- LEVORUP'un besinlerle birlikte alınması emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.  
- LEVORUP sadece ağızdan kullanım içindir.  
- Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

#### • Değişik yaş grupları:

##### - Çocuklarda kullanım:

- \* 2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
- \* 3 Eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.
- \* 10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar),
- \* 20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)
- \* 30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

##### - Yaşlılarda kullanım:

LEVORUP dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

##### • Özel kullanım durumları:

##### Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında fayda/risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LEVORUP'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuştunuz.

##### Kullanmadan önceki durumlarda daha fazla LEVORUP kullanmayınız:

LEVORUP'dan kullanmadan önceki durumlarda fazlasıyla kullanılmayan bir doktor veya eczacı ile konuştunuz.

**LEVOROP'U kullanmayı unutursanız** Unutulan dozlar dengelemek için çift doz almayınız.

**LEVOROP ile tedavi sonlandırıldığında olabilecek etkiler** Bulunmamaktadır.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEVORUP'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Afşedakilerden birisi olursa, LEVORUP'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVORUP'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Afşedakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Bulantı-kusma,
- Hazımsızlık,
- Midede yanma hissi,
- İshal,
- Halsizlik-yorgunluk-uyuşukluk,
- Baş ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Çarpıntı.
- Kalp atımının hızlanması
- Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsi ciddi yan etkilidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Afşedakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

• Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).

Bunlar LEVORUP'un hafif yan etkisidir. Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirdiniz.

#### Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### 5. LEVORUP'un saklanması

LEVORUP'u çocukların göremeyeceği, erişilemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

#### Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kutudaki/fitildeki son kullanma tarihinden sonra LEVORUP'u kullanmayınız.

Eğer üründen ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVORUP'u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Bikar İlaç San. ve Tic. A.Ş. Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No:14 Pendik/İstanbul

**Üretici:** Bikar İlaç San. ve Tic. A.Ş. Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No:14 Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı 04/12/2014 tarihinde onaylanmıştır.